

# Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects copyrights-free medical documents for non-lucratif use.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however, we are not able to contact all the authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on: facadm16@gmail.com

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.





Fingsse - transversale début w - épaule:

. aire du DS n'est occupée ni par pôle cephalique ni pôle pelvien

- feetus étalé transversalent, et se présente par une partie latérale.

4 houtent dystocique = expulsion impossible par les voiès naturelles.

Repére: acromion.

Variétés: 4 seulemt > \$ variétés transverses

Les dorse-ant the face ventrale du foetus s'adapte à la saillie du rachis maternel

Ly dorso-past: AIDP, AIGP

# Etiologies:

- grde multipare

   malfi utérines : cloisonné+++

  Cordiforme, à éperon.

   myome pranse
- myome practia, kyste de ovaire
- anlies bassin: aplate + saille du promontoire

- macrosome

## · annewelles:

- PP
- briéveté du cordon +++
- Hydramnios

- uterus a groaxe transveral ou oblique

- palpati

- palpati

- palpati

Fond uténin: vide + étalé

latéralent: percepti des 2 pôles foetaux

au ni 2 flancs

pôle cephalique:

rond, dur, arrondi

velumineur, dur, intégulier - auscultati: foyer BCF proche de l'ombilic du côté du pôle dephalique plus nets si dos en avant.

-TV: excavati vide, φ présentat, SI épais mal formé (nn engagés)

15 pat 10; psi PDE intacté: PDE volumineuse, saillante.
percept des repéres fortaux difficile.

PDE compre: morgnon de épaule + acromion + creux axillaire + grille costal + omoplate

Dc +: - siège (main + pied) - Face

### Scanned by CamScanner

```
Sur: www.la-faculte.net
                           Espace E-learning pour apprentissage gratuit online
                                                                     Pour utilisation Non-lucrative
Evolute:
            - mutate spontance en Pe entocique.
            - accou cht en comoluplicato-corporé = HIV très ancienne.
            - épaule mégligée: Pê transversale méconnue, imposée = 3 condité formelles: 4 condité relatives=
                                                   - P° a tenté de s'engager = immobile
             - W durant depuis longtps
                                                    - infé ovulaire patente en latente
             - PDE nompue
              - Merus retracté
                                                    -décès fortal après longue sonfrance
                                                       $ BCF
                                                   - version impossible.
            · Etiologiàs: multipare + φ suivi de gsse + φ PEC de l'accoucht.
            · SF: AEG + épuisent maternel , agitat , anxiété, faciés touique.
                   - CU inégulières: rapprochées + & relacht intercalaire
                   - DL lombaires +++
                   - Ed de prérupture: Triade de Bandl-Fromel:
                       userus inhoct:
                                                     uters accatical:
                    - Merus étranglé ensablier
                                                     - userus défurcent + OL d la cicatrice
                    -anneau de band et Fromel
                                                     - métrorragies
                    -T° DL des light ronds.
                                                     - SFA: 1 BCF, mort foetale.
            « Evoluti: si φ PEC => rupture utérire: tableau brotal associant:
               1 Dl abdominale en coup de prignants.
               @ ss = d'écontemt d'eau chande ds le ventre (LA)
               Détat de chac: pâleur, I filant, ...
             -aspect inégulier de l'abdomen: 2 masses s/peau: fectus + glde utérinde
              _TV: col rétracté, disparité de la présentaté, rétracté de l'userus,
                     métrorragies.
```

· Pc: f: grave: RU, infecté ovulaire, septicémie état dechoc suite à RPM

mort foetale.

```
CAT:
endehors du W: Primigeste → programmer cérarienne aterme (>385A)

Segmenhaire transversa
                                                           (segmentaine transversale arciforme)
en W (épaule): Primigete > cléanienne en urgence (segments-corporéale)
                  Ly multigerte of corrienne si voie basse possible
                  PDE intacte + dilatar complète
                                                             PDE nompre +1- dilatatincomp
                      VMI + grde extract desiège
                                                                   Ceranienha
o époule négligée: -> Foetis vivant -> cérarienne en urgence + ATB massive
                           mort - embryotomic
```

### Scanned by CamScanner